



Lièvre de mer


ocellé - *Aplysia dactylomela*




Anneaux foncés irréguliers



Herbivore



SON HISTOIRE



IMPACTS ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES

En Méditerranée, le lièvre de mer ocellé représente une menace écologique en raison de sa **colonisation rapide** des habitats intacts, y compris les herbiers essentiels de *Posidonia oceanica*, et de son **alimentation vorace** et **généraliste** sur les **macroalgues natives**. En séquestrant les **toxines alimentaires** issues d'algues, il **dissuade** efficacement les prédateurs locaux, ce qui lui permet d'établir des **populations denses perturbant** la **biodiversité** et les **fonctions écosystémiques locales**.

LE PETIT PLUS

Recycle les **toxines végétales** en **protection chimique**

Sous la menace, sécrète une **encre violette** défensive

Peut produire **100 millions** d'œufs par an

CRITÈRES D'IDENTIFICATION

Corps : pas de coquille externe, corps lisse, oval et bombé au milieu, 2 parapodes, 2 rhinophores sur la tête et 2 tentacules buccaux

Couleur : beige à jaune pâle avec des **anneaux noirs**



MINKA © xavi salvador costa CC BY-NC

ESPÈCES SIMILAIRES

Lièvre de mer moucheté - *Aplysia punctata*



Points roses ou bruns

MINKA © xavi salvador costa CC BY-NC

Aplysie visqueuse - *Aplysia depilans*



Marbrures noirâtres

MINKA © xavi salvador costa CC BY-NC

Signale ton observation

MINKA

BioObs

