




Lapa

zapatilla - *Crepidula fornicata*



SU HISTORIA



IMPACTOS ECOLÓGICOS Y ECONÓMICOS

Crepidula fornicata forma **apilamientos densos** que monopolizan el sustrato, limitando la **fijación de larvas locales**. Sus biodepósitos provocan el envasamiento de los fondos, favoreciendo **condiciones hipóxicas**, y su actividad metabólica **aumenta la presión de CO₂** en el agua, que se desgasifica hacia la atmósfera. **Compite** con los bivalvos, y sus conchas crean **microhábitats**, **modificando las redes tróficas**. Desde el punto de vista económico, **perturba la ostricultura** al obstruir las conchas de ostras y las estructuras de cultivo. **Aumenta los costes de gestión** (dragado, limpieza) para los profesionales.

EL DATO EXTRA

Hasta **20 individuos** en apilamiento

Larva planctónica que se fija gracias a una **sustancia química** secretada

Varios **miles de individuos** por metro cuadrado

CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN

Concha: lisa y ovalada con una gran abertura interna, el ápex apunta hacia atrás y está desplazado hacia la derecha


Color: blanco, amarillo, rosa o crema




ESPECIES SIMILARES

Especies **autóctonas** del Mediterráneo, todas más pequeñas


Crepidula gibbosa



Crepidula moulinii



Crepidula unguiformis



Comunica tu observación

