




Ascidie

japonaise - *Styela clava*




Filtreur



16 cm

SON HISTOIRE



IMPACTS ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES

Styela clava **perturbe les réseaux trophiques** par sa concurrence directe avec les espèces filtrantes indigènes. Elle **étouffe la faune benthique** sous ses colonies denses. Classée comme ravageur majeur ailleurs (Canada, Japon), elle menace la conchyliculture méditerranéenne par la **compétition alimentaire** (jusqu'à -50 % de rendement), la **surcharge des structures d'élevage**, et des **coûts accrus de gestion** (jusqu'à 80 % des coûts de production). Elle pose aussi des **risques pour la santé** des travailleurs (problèmes dorsaux, respiratoires).

LE PETIT PLUS

Produit une **substance antibactérienne**

Ascidie : modèle clé pour étudier l'évolution

Consommée en Corée

CRITÈRES D'IDENTIFICATION

Forme du corps : corps ovoïde allongé en **forme de massue**, fixé par un pédoncule **étroit et rigide** avec à la base un disque de fixation. **2 siphons rapprochés** à l'extrémité antérieure du corps.

Tunique : **épaisse, ridée** longitudinalement, surface mamelonnée sur la partie antérieure

Couleur : **brun clair avec pédoncule brun foncé** (individus larges); **jaune-brun** (individus petits)



MINKA
© xavi salvador costa CC BY-NC

ESPÈCE SIMILAIRE

Ascidie plissée - *Styela plicata*

Espèce **non-indigène** de méditerranée

Peu épaisse
Lignes violacées



8 cm



MINKA © badosa CC BY-NC

Signale ton observation

MINKA



BioObs

