





Poisson-lapin

à ventre strié - *Siganus rivulatus*



SON HISTOIRE



IMPACTS ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES

L'espèce *Siganus rivulatus* **surpâture** les **macroalgues**, transformant les paysages et impactant les herbivores natifs comme *Sarpa salpa*. **Très adaptable** aux variations de température, de salinité et à la pollution, il prospère dans des habitats variés, des baies rocheuses aux ports pollués. Il présente une **valeur commerciale** pour les petites pêches côtières et un potentiel pour l'**aquaculture** grâce à sa croissance rapide et sa résilience. Sa chair est **comestible** et appréciée dans certaines régions, mais il peut présenter un risque de **ciguatera** dans certaines zones.

LE PETIT PLUS

Dans la liste des **100 espèces les plus envahissantes** en Méditerranée

Capable de se **camoufler** selon l'environnement ou le contexte

Sources (détails page "Crédits") : Bariche et al. (2004); Karachle et al. (2016); Popper et al. (1975); Saoud et al. (2008); Stavrakidis-Zachou et al. (2024)

CRITÈRES D'IDENTIFICATION

Forme du corps : **ellipsoïde**, première épine dorsale vers l'avant, nageoire caudale **fourchue** et une petite bouche avec des **replis labiaux**.

Couleur : **vert olive à brun**, avec de fines bandes jaunes.




MINKA © xavi salvador costa CC BY-NC

ESPÈCES SIMILAIRES


Poisson-lapin à queue tronquée - *Siganus luridus*

Seule autre espèce du même genre présente en méditerranée, également non-indigène



Saupe - *Sarpa salpa*

Espèce native de Méditerranée



MINKA © xavi salvador costa CC BY-NC

Signale ton observation

MINKA



BioObs

